


SEMBRALIA ABONADO TOMATE



TRATAMIENTO 1

A los 7 días del trasplante:

TIPO DE PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTO	Marca	DOSIS POR HECTAREA (Litros)
Mejorador de suelo con materia orgánica	NK orgánico de origen vegetal	INB	7 litros/ha
Abono	MC NPK 12-25-12	MC Bio	8,5 litros/ha

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- **NK orgánico de origen vegetal:** Mezclar 7 litros de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego.
- **MC NPK 12-25-12:** Mezclar 8,5 L de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego.

TRATAMIENTO 2

A los 7 días del primer tratamiento y repetir durante 4-5 semanas:

TIPO DE PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTO	Marca	DOSIS POR HECTAREA
Aminoácidos y micronutrientes	INB con Aminoácidos y microelementos	INB	2 kg/ha
Materia Orgánica	NK orgánico de origen vegetal	INB	7 litros/ha
Abono	MC NPK 20-5-15	MC Bio	10 litros/ha

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- **INB con Aminoácidos y microelementos:** Mezclar 2 kg de producto en 20.000L de agua (1 por cada 10.000 litros de agua) para preparar el caldo y añadir al riego.
- **MC NPK 20-5-15:** Mezclar 10 L de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego.
- **NK orgánico de origen vegetal:** Mezclar 5 Litros de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego.

TRATAMIENTO 3:

A la aparición de los primeros frutos:

TIPO DE PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTO	Marca	DOSIS POR HECTAREA
Abono con Ca y Mg	Abono nitrogenado con Calcio y Magnesio	INB	3-5 litros/ha cada 15 días después de la aparición del 1º ramillete
Aminoácidos	INB con aminoácidos y Mo	INB	0,7-1 L/1000 L 2 a 3 aplicaciones foliares cada 15 días
Corrector Engorde	INB NK 3-31	INB	3-4 Litros/Ha. 5 aplicaciones durante la fase de engorde

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- **Abono INB nitrogenado con Calcio y Magnesio:** Mezclar 3-5 Litros de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego.
- **Abono INB con aminoácidos y Molibdeno:** Mezclar 0,7-1 Litro de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y aplicar foliarmente.
- **INB cuaje NK 3-31:** Mezclar 2-3 L de producto en 1000L de agua para preparar el caldo y añadir al riego. 5 aplicaciones durante la fase de engorde de los frutos.